

認定看護師通信

※認定看護師はCNと標記します。Certified Nurseの略になります。

★ワクチンと抗体価★

今回の担当は
感染管理です。



はれるん

B型肝炎	おたふく	麻疹	風疹	水痘
10未満	4未満 (-or+-)	16未満	8未満	4未満

※当院ではEIA法を用いて、入職時と転勤等での異動時にウイルス抗体価を調べています。表の数値より低いと抗体がないということです

【抗体価が基準を下回っていることでの問題】

- 流行性ウイルス疾患に罹患し、潜伏期間中に就業し患者へ曝露する。
- 入院患者の抗体価は不明、よって院内感染してしまう危険性。
- ウイルスによっては空気感染もあるため、予防が難しい。

 **医療従事者として抗体価の把握・ワクチン接種は大切** 

【ウイルス性疾患の潜伏期・感染期間・感染経路】

疾患	潜伏期	感染期間	感染経路
麻疹	約10日	発疹出現4日～出現後4日	空気感染
水痘	14～21日	発疹出現前1～2日から後4日 (痂皮化するまで)	空気感染 接触感染
風疹	16～23日	発症前7日～後5日	飛沫感染
おたふく	16～23日	発症前7日～後9日	飛沫感染
インフルエンザ	1～3日	発症前1日～後5日	飛沫感染

潜伏期間が長いこと！感染期間が長いこと！それが、知らない内に感染を広げる原因です。防ぐには抗体を獲得する以外に方法なし！

認知症認定看護師の西川が9月より復帰いたしました！！

次回は12月・おたのしみに